

Termometras

Gaminant termometrą galima naudoti įvairius skysčius, pvz., etilo alkoholį, gyvsidabrij.

1. Parašykite 3 savybes, kuriomis turi pasižymėti skystis, naudojamas termometruose:

a)

b)

c)

2. Kokie gyvsidabrio termometro privilumai?


.....
.....
.....

3. Kodėl atsisakoma gyvsidabrio termometrų? Nurodykite dvi priežastis.

a)

b)

4. Šiuo metu medicininiuose termometruose vietoje gyvsidabrio naudojamas galinstanas (68,5 % galio, 21,5 % indžio ir 10 % alavo lydinys).



.....
.....

5. Fizikos moksle temperatūros matavimo vienetas yra kelvinas (vienas iš 7 pagrindinių Si vienetų, žymimas K). Baikite pildyti lentelę, kurioje susietos dvi temperatūros skalės.

Skalės pavadinimas	Absoliutus nulis	Vandens užšalimas	Vandens virimas
Kelvino skalė	0 K		
Celsijaus skalė	-273 °C		

Termometras

6. Parašykite, kodėl fizikos moksle reikia naudoti Kelvino skalę, o ne Celsijaus. Pateikite du pagrindimus (praktinj ir teorinj).

1.

.....
.....
.....

2.


.....
.....
.....

7. Paveiksle pavaizduotas termometro modelis, kurį galima pasigaminti patiemis.

- 7.1. Kurioje vietoje turėtų būti žemiausios temperatūros žyma?

- 7.2. Kodėl naudojami ploni (kapiliariniai) vamzdeliai?


- 7.3. Kodėl termometro kapiliarinio vamzdelio viršutinis galas turi būti uždaras?



8.

Grafike pateikta vandens tankio priklausomybė nuo temperatūros.

Naudojant tas pačias medžiagas buvo sukurti trys vandens termometrai, skirti temperatūroms matuoti nuo 0 °C iki 4 °C, 4 °C iki 8 °C ir nuo 8 °C iki 12 °C.



Termometras

8.1. Kuo iš esmės skyrësi šie termometrai?

8.2. Kuris termometras ir kodël tiksliau matavo temperatûrą. Nurodykite du argumentus.

1.

2.

9. Nurodykite tris priežastis, kodël vanduo netinkamas skystis naudoti termometruose.

1.

2.

3.

10. Aprašykite, kaip namų salygomis galiama teisingai sukalibruoti tokio termometro skalę.

11. Sukurkime temperatûros skalę, pagrįstą propilo alkoholio (propanolio) užšalimo ir virimo temperatûra. Propanolis užšala esant -90°C , o užverda esant 82°C . Naujoji skalė bûtų sugraudinta propanolio matavimo vienetais ${}^{\circ}\text{P}$ taip, kad propanolis užšaltų esant 0°P , o virtų esant 82°P temperatûrai.

11.1. Laipsnių (${}^{\circ}\text{P}$) tikslumu nustatykite, kokiaje temperatûroje (${}^{\circ}\text{P}$) užšala vanduo.

11.2. Nustatykite normalią žmogaus temperatûrą ($36,6^{\circ}\text{C}$).

Termometras

11.3.


Pasiūlykite būdą, kaip patobulinti temperatūros propanolio matavimo vienetas skalę, kad jis tiksliau matuotų temperatūrą.

11.4.

Pasiūlykite, kaip patobulinti termometrą, kad jis tiksliau matuotų temperatūrą.

12.

Siekiant nustatyti savitą vandens šilumą, buvo sukonstruotas tokis įrenginys:



Šio eksperimento metu gauti duomenys pateikti lentelėje:

Vandens temperatūra eksperimento pradžioje 20 °C	Vandens temperatūra eksperimento pabaigoje 43 °C
Elektrinio šildytuvo galia 50 W	Šildymo laikas 16 min
Vandens masė 0,5 kg	

12.1.

Kam reikalinga šilumos izoliacija aplink vandens rezervuarą?

12.2.

Apskaičiuokite vandens savitą šilumą.

Elektrinio šildytuvo atiduotas šilumos kiekis


Termometras

13.

Ilgėjant eksperimento laikui, apskaičiuota savitosios šilumos reikšmė nežymiai keitėsi. Kaip manote, didėjo ar mažėjo savitosios šilumos reikšmė, ir paaiškinkite, kodėl.

14.

Norint nustatyti ledo savitąją lydymosi šilumą, buvo sukonstruotas toks įrenginys:



14.1.

Ivardykite, kokių dar reikia priemonių, kad galėtume atlikti eksperimentą ir suskaičiuoti savitąją ledo lydymosi šilumą.

14.2.

Paaiškinkite, kodėl eksperimento metu negalima naudoti, pvz., $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ledo, o reikia naudoti $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ledą.

14.3.

Paaiškinkite, kaip apskaičiuoti savitąją ledo lydymosi šilumą.


Termometras

14.4.

Kodėl nepatartina šiame eksperimente naudoti žymiai galingesnio elektrinio šildytuvo? Nurodykite dvi priežastis.

1.


2.



- Savitoji plieno šiluma 500 J/kg
- Savitoji vandens šiluma $4200 \text{ J/(kg } ^\circ\text{C)}$

15.

Paveiksle pavaizduotas plieniniame inde šildomas vanduo ir temperatūros jutikliu užfiksuotas temperatūros kitimas suteikus nurodytą šilumos kiekį .



15.1.

Ivardykite, kurios medžiagos gauna šilumos ir kas vyksta šių procesų metu.

I procesas

II procesas

III procesas

15.2.

Antrojo proceso metu, keičiantis medžiagos aggregatinei būsenai, nekinta temperatūra, nors suteikiamas šilumos kiekis. Paaiškinkite, kam panaudojama gauta energija.

Termometras

15.3. Apskaičiuokite plieninio indo masę.

15.4. Kam lygi šildomo vandens masė? Tarkime, plieninio indo masė 0,1 kg.

